

**Curso Básico**

**de**

**Mecânica dos**

**Fluidos**

**Unidade 4**

**Raimundo Ferreira Ignácio**

**Unidade 4 - Análise Dimensional e Semelhança Mecânica.****Objetivos:**

1. Mostrar a vantagem de recorrermos a análise dimensional e semelhança mecânica;
2. Definir uma curva universal;
3. Introduzir os conceitos, tais como:
  - Função Característica;
  - Grandezas Fundamentais;
  - Grandezas Derivadas;
  - Equação Dimensional;
  - Números Adimensionais;
  - Modelo;
  - Protótipo;
4. Introduzir o teorema dos  $\pi$
5. Mencionar a condição de semelhança completa;
6. Definir a escala de semelhança;
7. Aplicar o teorema dos  $\pi$  em diversos exemplos;
8. Introduzir os adimensionais típicos das bombas hidráulicas;
9. Mostrar como é obtida a curva universal das bombas hidráulicas.

**Sumário:**

- 4.1 Introdução
- 4.2 Função característica
- 4.3 Grandezas fundamentais
- 4.4 Grandezas derivadas
- 4.5 Equação dimensional
- 4.6 Números adimensionais
- 4.7 Modelo
- 4.8 Protótipo
- 4.9 Teorema dos  $\pi$
- 4.10 Condição de semelhança completa
- 4.11 Escala de semelhança
- 4.12 Adimensionais típicos das bombas hidráulicas
- 4.13 Levantamento da curva universal de uma bomba
- 4.14 Exercícios
- 4.15 Respostas dos exercícios

**Objetivos da primeira aula da unidade 4:****Mostrar as vantagens da utilização da teoria de semelhança em aplicações da engenharia;****Evocar os conceitos de:**

- **função característica,**
- **grandezas fundamentais,**
- **grandezas derivadas,**
- **equação dimensional e**
- **números adimensionais.**

**4.1 Introdução**

Este capítulo não é uma peculiaridade da Mecânica dos Fluidos, porém para ela ocupa um papel relevante, já que parte de seu desenvolvimento teve origem experimental.

Vamos inicialmente mostrar a vantagem de recorrermos a **análise dimensional** no estudo de certas aplicações da engenharia.

Consideremos a seguinte aplicação:

- **Estuda-se em laboratório a força de resistência (força de arraste) que um dado fluido ( $\rho_1$  e  $\mu_1$ ) exerce no deslocamento de uma esfera (de diâmetro  $D$ ) em seu meio.**

A experiência realizada para o referido estudo é representada pela figura 4.1




Figura 4.1

Variando-se a velocidade  $v_1$ , para uma dada esfera de diâmetro  $D_1$  e para um dado fluido ( $\rho_1$  e  $\mu_1$ ), pode se obter a tabela apresentada a seguir:

$v_1$ (m/s)	---	---	...
$F_1$ (N)	---	---	...

Através da tabela anterior, obtém-se a curva representada pela figura 4.2




Figura 4.2

Podemos constatar facilmente que a curva representada na figura 4.2 é uma **curva particular**, mesmo porque apresenta, tanto na ordenada como na abscissa, grandezas dimensionais.

**Objetivo** - Generalizar as informações obtidas em laboratório.

Para que possamos exemplificar o objetivo mencionado anteriormente, vamos supor que nos seja dirigida a seguinte questão:

**“Qual a força exercida em uma esfera de diâmetro  $D_2$  ; quando esta se desloca no mesmo fluido com a velocidade  $v_2$ ?”**

**Condição:** A resposta da questão deve ser obtida sem se recorrer a ensaios.

É justamente para satisfazer esta condição que recorreremos à **análise dimensional**.

Temos as seguintes variáveis que causam influência no fenômeno:

F - força de arraste

D - diâmetro da esfera

v - velocidade da esfera **ou** velocidade do fluido

$\rho$  - massa específica do fluido

$\mu$  - viscosidade do fluido

**A análise dimensional determina os números adimensionais (números puros) que definem o fenômeno estudado. Para o exemplo anterior, temos:**

$$\pi_1 = \frac{F}{\rho v^2 D^2} \quad \text{e} \quad \pi_2 = \frac{\mu}{\rho v D}$$

Pelo fato das duas situações: a ensaiada em laboratório e a é questionada, serem **semelhantes**, podemos afirmar que ambas são caracterizadas pelas mesmas variáveis, o que equivale a dizer que  $\pi_1$  e  $\pi_2$  definem as duas situações.

Podemos a partir dos dados obtidos no ensaio, obter a tabela representada a seguir:

$v_1$ (m/s)	$F_1$ (N)	$\pi_1 = \frac{F}{\rho v^2 D^2}$	$\pi_2 = \frac{\mu}{\rho v D}$	Dados:
-	-	-	-	$D_1$
				$\rho_1$
				$\mu_1$

A partir da tabela anterior, podemos obter a **curva universal do fenômeno**, figura 4.3, que é aquela que tanto na ordenada como na abscissa, temos **números adimensionais (números universais)**; o que equivale a dizer que, valem tanto para o fenômeno ensaiado em laboratório como para o fenômeno que é questionado.

Pela condição de semelhança, podemos escrever que:

$$\pi_1)_{\text{ensaiado}} = \pi_1)_{\text{questionado}} \quad \text{e} \quad \pi_2)_{\text{ensaiado}} = \pi_2)_{\text{questionado}}.$$




Figura 4.3

Para o fenômeno questionado, temos os seguintes dados:  $\rho_2 = \rho_1$ ;  $\mu_2 = \mu_1$ ;  $D_2$  e  $v_2$ , e isto nos permite calcular:

$$\pi_2)_{questionado} = \frac{\mu_2}{\rho_2 v_2 D_2} \text{ que pela condição de semelhança é igual a } \pi_2)_{ensaiado}.$$

Marcando  $\pi_2)_{q} = \pi_2)_{e}$  na abscissa da **curva universal**, podemos ler, na ordenada  $\pi_1)_{ensaiado}$ , que pela condição de semelhança é igual a  $\pi_1)_{questionado}$ .


$$\pi_1)_{questionado} = \text{“A”} = \frac{F_2}{\rho^2 v_2^2 D_2^2}, \text{ e isto permite calcular a força } F_2 \text{ sem recorrer a ensaios, já que:}$$

$$F_2 = \text{“A”} \times \rho_2 \times v_2 \times D_2$$

## 4.2 Função Característica

Representa as variáveis que causam influência no fenômeno.

$$\text{Exemplo : } f(F, V, \rho, \mu, D) = 0$$



## 4.3 Grandezas Fundamentais

As grandezas fundamentais adotadas para os fenômenos da Mecânica dos Fluidos, geralmente são:

- F - Força
- L - Comprimento
- T - Tempo

## 4.4 Grandezas Derivadas

As grandezas derivadas de um fenômeno são todas as demais grandezas, excluindo-se as grandezas fundamentais.

## 4.5 Equação Dimensional

É a forma usada para definirmos uma **grandeza derivada** em função das **grandezas fundamentais**.

As equações dimensionais geralmente são escritas em forma de produto de potências, onde as bases são constituídas pelas grandezas fundamentais e os

expoentes indicam o grau de dependência da grandeza derivada em função das grandezas fundamentais.

Exemplos:

$$[F] = F \rightarrow G.F.$$

$$[V] = L \times T^{-1} \rightarrow G.D.$$

$$[\rho] = F \times L^{-4} \times T^2 \rightarrow G.D.$$

$$[\mu] = F \times L^{-2} \times T \rightarrow G.D.$$

$$[D] = L \rightarrow G.F.$$

#### 4.6 Números Adimensionais - $\pi$


São números puros, obtidos através de uma combinação adequada das variáveis que causam influência no fenômeno.

A equação dimensional de um número adimensional será sempre:  $[\pi] = F^0 L^0 T^0$ , sendo esta a forma de verificarmos se o mesmo é ou não número adimensional.

Exemplo:

$$\pi_1 = \frac{F}{\rho \cdot V^2 \cdot D^2}$$

$$[\pi_1] = \frac{F}{(F \times L^{-4} \times T^2) \cdot (L \times T^{-1})^2 \cdot (L)^2} = F^0 L^0 T^0$$



“O que deve ser instaurado é a pedagogia que começa pelo diálogo, pela comunicação, por uma nova relação humana que possibilite ao próprio povo a elaboração de uma consciência crítica do mundo em que vive.”

Contracapa do livro: EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA LIBERDADE, que foi escrito pelo Professor Paulo Freire, que está estampado na minha camiseta.